

СОВРЕМЕННЫЕ АНЕСТЕТИКИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

АРТИКАИН С АДРЕНАЛИНОМ



картриджи – 1,7 мл и 1,8 мл
ампулы – 1 мл и 2 мл

- высокое качество стекла, плунжера, колпачка с пробкой;
- плунжер с аспирационным отверстием;
- градуировка для контроля вводимой дозы.

высокое качество стекла



Содержание артикаина	40 мг/мл
Содержание эпинефрина	0,005 мг/мл
Время наступления эффекта	от 1 до 3-х минут
Время эффективной анестезии	НЕ МЕНЕЕ 45 МИНУТ
Эффективность в хирургии	99,9%
Эффективность в терапии	98,5%
Не содержит парабенов	

Показания к применению комбинации артикаина (40 мг/мл) и эпинефрина (0,005 мг/мл)

Инфильтрационная и проводниковая анестезия в стоматологии:

- плановые вмешательства, такие как неосложненное удаление одного или нескольких зубов, обработка кариозных полостей, obtachивание зубов перед протезированием.

Оптимальный состав препаратов:

Благодаря наличию эпинефрина (адреналина) в препаратах Артикаин с адреналином форте и Артикаин с адреналином пролонгируется действие лекарственного средства, снижается риск возникновения кровотечений в области хирургического вмешательства.

Минимум побочных эффектов:

Эпинефрин (адреналин) препятствует излишней абсорбции артикаина и развитию его побочных эффектов. Вследствие низкого содержания эпинефрина (адреналина) в препаратах его действие на сердечно-сосудистую систему незначительно: почти не отмечается повышение артериального давления и увеличение числа сердечных сокращений. Применение препаратов Артикаин с адреналином форте и Артикаин с адреналином не задерживает процесс заживления операционной раны и сводит к минимуму возможность развития осложнений.

- безопасное применение у пациентов группы риска;
- возможно применение в детском возрасте (у детей старше 4 лет). Дозы препаратов Артикаин с адреналином и Артикаин с адреналином форте подбираются в зависимости от возраста и массы тела ребенка, но они не должны превышать 7 мг артикаина на 1 кг массы тела (0,175 мл/кг). Применение препаратов у детей младше 1 года не изучалось;
- препараты характеризуются хорошей тканевой переносимостью и минимальным сосудосуживающим действием;
- активные вещества в минимальной степени проникают через плацентарный барьер, практически не выделяются с грудным молоком.

Показания к применению комбинации артикаина (40 мг/мл) и эпинефрина (0,01 мг/мл)

Для местной анестезии (инфильтрационная и проводниковая анестезия).

Показан при травматичных вмешательствах и при необходимости выраженного гемостаза или улучшения визуализации операционного поля:

- стоматологические операции на слизистой оболочке или костях, требующие создания условий более выраженной ишемии,
- операции на пульпе зуба (ампутация или экстирпация),
- удаление сломанного зуба (остеотомия) или зуба, пораженного апикальным пародонтитом,
- продолжительные хирургические вмешательства, чрескожный остеосинтез,
- экцизия кист,
- вмешательства на слизистой оболочке десны.

АРТИКАИН

картриджи – 1,7 мл
ампулы – 1 мл и 2 мл



- высокое качество стекла, плунжера, колпачка с пробкой;
- плунжер с аспирационным отверстием;
- градуировка для контроля вводимой дозы.

высокое качество стекла



Содержание Артикаина	40 мг/мл
Время наступления эффекта	от 1 до 3-х минут
Время эффективной анестезии	НЕ МЕНЕЕ 20 МИНУТ
Эффективность в хирургии	99,9%
Эффективность в терапии	98,5%
Не содержит проаллергенов и консервантов (парабены, сульфиты, ЭДТА)	



АРТИКАИН
срок годности 3 года — картриджи и ампулы.
Регистрационное удостоверение ЛСР-008522/10 от 23.08.2010

АРТИКАИН С АДРЕНАЛИНОМ
срок годности 2,5 года — картриджи; 3 года — ампулы.
Регистрационное удостоверение ЛП-001943 от 20.12.2012

АРТИКАИН С АДРЕНАЛИНОМ ФОРТЕ
срок годности 2,5 года — картриджи; 3 года — ампулы.
Регистрационное удостоверение ЛСР-008523/10 от 23.08.2010

Препарат оптимален при работе с пациентами с аллергологическим анамнезом, в геронтологической и детской стоматологии (для детей старше 4 лет).

Препарат выбора в стоматологической практике:

- не содержит эпинефрин (адреналин);
- не содержит сульфиты;
- обладает сильным обезболивающим действием, превышающим действие новокаина в 6 раз, лидокаина в 3 раза и мепивакаина в 1,5 раза;
- менее токсичен, чем другие анестетики, в связи с тем, что почти полностью связывается с белками плазмы крови (95%);
- возможно использование при лечении беременных и кормящих матерей. В меньшей степени, чем другие анестетики, проникает через плаценту, не оказывает действия на плод при любой технике применения и дозе. Практически не попадает в грудное молоко. В период лактации нет необходимости прерывать кормление грудью;
- быстро инактивируется в организме (период полувыведения составляет около 25 минут), что является причиной его низкой токсичности, возможны повторные введения препарата

Показания к применению артикаина в дозировке 40 мг/мл:

- местный анестетик для инфильтрационной и проводниковой анестезии в стоматологии. Артикаин без эпинефрина применяется преимущественно для коротких процедур,
- при необходимости введения небольших объемов препарата (в области передних зубов, неба),
- у пациентов, у которых применение эпинефрина не допустимо (например, при сердечнососудистых заболеваниях),
- у пациентов с аллергической реакцией на сульфиты (возможно использование при сопутствующей бронхиальной астме).

Владелец регистрационного удостоверения ЗАО «Бинергия»
E-mail: info@binergia.ru или commerc@binergia.ru
По вопросам закупки: АО «Фаворит трейд»
тел.: +7 (495) 580-55-02, доб. 123;112; +7 (915) 202-34-30;
+7 (915) 201-34-74; факс: +7 (495) 580-55-03

В случае вашей заинтересованности стать дистрибьютером препаратов АРТИКАИН, АРТИКАИН С АДРЕНАЛИНОМ и АРТИКАИН С АДРЕНАЛИНОМ ФОРТЕ обращайтесь по телефону: +7 (495) 580-55-02, доб. 123