

СОВРЕМЕННЫЕ АНЕСТЕТИКИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

АРТИКАИН С АДРЕНАЛИНОМ



- высокое качество стекла, плунжера, колпачка с пробкой;
- плунжер с аспирационным отверстием;
- градуировка для контроля вводимой дозы.

картриджи – 1,7 мл
ампулы – 1 мл и 2 мл

высокое качество
стекла



Содержание артикаина	40 мг/мл
Содержание эпинефрина	0,005 мг/мл
Время наступления эффекта	от 1 до 3-х минут
Время эффективной анестезии	НЕ МЕНЕЕ 45 МИНУТ
Эффективность в хирургии	99,9%
Эффективность в терапии	98,5%
Не содержит парабенов.	

Оптимальный состав препаратов:

Благодаря наличию эпинефрина (адреналина) в препаратах Артикаин с адреналином форте и Артикаин с адреналином пролонгируется действие лекарственного средства, снижается риск возникновения кровотечений в области хирургического вмешательства.

Минимум побочных эффектов:

Эпинефрин (адреналин) препятствует излишней абсорбции артикаина и развитию его побочных эффектов. Вследствие низкого содержания эпинефрина (адреналина) в препаратах его действие на сердечно-сосудистую систему незначительно: почти не отмечается повышение артериального давления и увеличение числа сердечных сокращений. Применение препаратов Артикаин с адреналином форте и Артикаин с адреналином не задерживает процесс заживления операционной раны и сводит к минимуму возможность развития осложнений.

- безопасное применение у пациентов группы риска;
- возможно применение в детском возрасте (у детей старше 4 лет);
- препараты характеризуются хорошей тканевой переносимостью и минимальным сосудосуживающим действием;
- активные вещества в минимальной степени проникают через плацентарный барьер, практически не выделяются с грудным молоком.

АРТИКАИН С АДРЕНАЛИНОМ ФОРТЕ



- высокое качество стекла, плунжера, колпачка с пробкой;
- плунжер с аспирационным отверстием;
- градуировка для контроля вводимой дозы.

картриджи – 1,7 мл
ампулы – 1 мл и 2 мл

высокое качество
стекла



Содержание артикаина	40 мг/мл
Содержание эпинефрина	0,01 мг/мл
Время наступления эффекта	от 1 до 3-х минут
Время эффективной анестезии	НЕ МЕНЕЕ 75 МИНУТ
Эффективность в хирургии	99,9%
Эффективность в терапии	98,5%
Не содержит парабенов.	

Показания к применению:

Инфильтрационное обезболивание вмешательств на верхней и нижней челюсти, проводниковая анестезия, в том числе:

- при неосложненном удалении зубов верхней челюсти;
- при удалении премоляров нижней челюсти;
- при препарации полостей и обточке зубов перед протезированием;
- при операции на слизистых оболочках или кости, требующие выраженного эффекта ишемии;
- при кистэктомии.

АРТИКАИН



картриджи – 1,7 мл
ампулы – 1 мл и 2 мл

- высокое качество стекла, плунжера, колпачка с пробкой;
- плунжер с аспирационным отверстием;
- градуировка для контроля вводимой дозы.

высокое качество
стекла



Содержание Артикаина	40 мг/мл
Время наступления эффекта	от 1 до 3-х минут
Время эффективной анестезии	НЕ МЕНЕЕ 20 МИНУТ
Эффективность в хирургии	99,9%
Эффективность в терапии	98,5%
Не содержит проаллергенов и консервантов (парабены, сульфиты, ЭДТА)	

Препарат выбора в стоматологической практике:

- не содержит эпинефрин (адреналин);
- обладает сильным обезболивающим действием, превышающим действие новокаина в 6 раз, лидокаина в 3 раза и мепивакаина в 1,5 раза;
- менее токсичен, чем другие анестетики, в связи с тем, что почти полностью связывается с белками плазмы крови (95%);
- возможно использование при лечении беременных и кормящих матерей. В меньшей степени, чем другие анестетики, проникает через плаценту, не оказывает действия на плод при любой технике применения и дозе. Практически не попадает в грудное молоко. В период лактации нет необходимости прерывать кормление грудью;
- быстро инактивируется в организме (период полувыведения составляет около 20 минут), что является причиной его низкой токсичности, возможны повторные введения препарата в случае необходимости;
- не обладает кардиодепрессивным эффектом.

Показания к применению:

Инфильтрационная и проводниковая анестезия в стоматологии:

- при неосложненном удалении зубов верхней челюсти в невоспалительной стадии;
- для анестезии при небных разрезах и наложении швов;
- при удалении премоляров нижней челюсти в неосложненной стадии инфильтрационная анестезия дает эффект проводникового обезболивания;
- при препарации полостей и обточке зубов перед протезированием;
- может применяться для объемных операций и операций продолжительностью более 20 минут (возможно пролонгирование анестезии путем докальвания анестетика);
- у пациентов, для которых использование эпинефрина (адреналина) противопоказано из-за возможного сердечно-сосудистого заболевания;
- у пациентов с аллергической реакцией на сульфиты (возможно использование при сопутствующей бронхиальной астме).

Препарат оптимален при работе с пациентами с аллергологическим анамнезом, в геронтологической и детской стоматологии (для детей старше 4 лет).

БИНЕРГИЯ



Артикаин

срок годности 3 года – картриджи и ампулы
Регистрационное удостоверение ЛСР-008522/10 от 23.08.2010

Артикаин с адреналином

срок годности 2 года – картриджи; 3 года – ампулы
Регистрационное удостоверение ЛП-001943 от 20.12.2012

Артикаин с адреналином форте

срок годности 2 года – картриджи; 3 года – ампулы
Регистрационное удостоверение ЛСР-008523/10 от 23.08.2010

Владелец регистрационного удостоверения
ЗАО «Бинергия» e-mail: info@binergia.ru

По вопросам закупки: ООО «БРИН-Фарм»
тел.: +7 (495) 580-55-02, доб. 123;124;128
+7 (915) 202-31-41; +7 (915) 201-34-74
+7 (915) 202-34-30; +7 (903) 977-74-73
факс: +7 (495) 580-55-03

В случае вашей заинтересованности
стать дистрибьютером препаратов АРТИКАИН, АРТИКАИН
С АДРЕНАЛИНОМ и АРТИКАИН С АДРЕНАЛИНОМ ФОРТЕ
обращайтесь по телефону: +7 (495) 580-55-02, доб. 120